

환자 지침

헬리코박터 파이로리 요소호기검사

귀하의 의사가 헬리코박터 파이로리 요소호기검사를 시행하도록 요청했습니다. 의미있는 실험실 테스트 결과를 얻기 위해 아래의 지침을 따라야합니다.

검사 전

감귤에 알레르기가있는 환자는이 검사를 받을 수 없습니다.

이 검사 전 4 시간 동안 담배를 피거나 아무 음식도 섭취하지 마십시오. 검사 1 시간 전에 어떤 음료수도 마시지 마십시오.

헬리코박터 파이로리 검사 전 몇 시간 동안에 대한	환자 지침
검사받기 4시간 전	음식물 섭취나 흡연을 금하십시오. 필요에 따라 음료를 마시십시오(예: 커피, 주스, 물 등은 괜찮습니다).
검사받기 3시간 전	먹거나 담배를 피지 마십시오. 필요에 따라 음료를 마시십시오(예: 커피, 주스, 물 등은 괜찮습니다).
검사받기 2시간 전	먹거나 담배를 피지 마십시오. 필요에 따라 음료를 마시십시오(예: 커피, 주스, 물 등은 괜찮습니다).
검사받기 1시간 전	어떤 음식이나 음료수도 섭취하지 마시고 흡연도 하지 마십시오.

이 검사를 받기 전에 의사와 약물 사용에 대해 상의하십시오.

항생제와 산을 낮추는 약물은 이 검사를 방해 할 수 있으며 검사 전에 괄호 안에 표시된 기간 동안 복용하지 않아야합니다.

1. 항생제 예: 아목시실린, 클라리스로 마이신, 메트로니다졸, 테트라 사이클린(4 주간)
2. 조제된 Bismuth 예: 펩토비스말(2 주간)
3. 프로톤 펌프 억제제 예: 벅시움, 파리에트, 프레베시드, 로섹, 판톨록, 판토프라졸 (Tecta®) (7 일)
4. 히스타민 2 수용체 길항제 예: 잔탁, 타가메트, 펌시드(1 일)
5. 제산제 예: 말록스, 디오볼, 개비스콘, 텀즈(1 일)

상기 약물 중 어느 것이라도 복용하시는 경우, 검사를 받기 전에 의사와 상의 할 것을 권장합니다.

검사실에 도착했을때:

검사를 완료하는 데 약 40 분이 소요됩니다. 검사를 받는 동안 계속 검사실에 머물러 있도록 요구됩니다. 이 검사는 임신 중에 받아도 안전합니다.

채취관련 설명

1. 검사받기 전 4시간 동안 단식하십시오:

- a. 담배를 피지 마십시오.
- b. 어떤 음식도 섭취하지 마십시오.
- c. 검사받기 전 한 시간 동안 어떤 음료수도 마시지 마십시오.

주의사항: 금식 기간 동안 껌을 씹거나 이를 닦는 것은 허용됩니다.

2. 호흡 샘플 제공

- a. 정상적으로 숨을 들이마시십시오.
- b. 콜렉션 튜브에 넣은 빨대를 통해 4 ~ 8 초간 숨을 내쉽니다.
- c. 내쉬기가 끝날 때까지 천천히 수거 튜브에서 빨대를 제거하고 빨대가 튜브에서 완전히 분리 될 때까지 계속 숨을 내쉬십시오.

3. 레몬-라임 용액을 마십니다.

4. 환자 서비스 센터에서 30 분을 기다리십시오(이 때, 담배를 피우거나 먹거나 마시지 마십시오).

5. 상기 2번째 단계에서와 동일한 방법으로 두번째 호흡 샘플을 제공하십시오.