

患者指南

痰-培養與敏感性試驗或結核/抗酸桿菌檢查

您的醫務人員要求您提供痰的樣本，以進行下述[x]項的測試。為了獲得有意義的化驗所測試結果，請嚴格遵循這些說明。

[] 痰培養與敏感性(C&S)試驗：

痰的採集

1. 痰是經過深度咳嗽從肺部產生的物質。痰不是唾液。
2. 在起床時或任何時間，把痰收集到所提供的“C&S”容器。

貼標籤

1. 貼在每個容器上的標籤要寫上您的名字、出生日期和採樣日期。

包裝

1. 將盛痰的容器放入提供的一個袋子，並牢固地封閉袋子。
2. 將書面文件覆摺好放入樣本運輸袋的外部兜內。這就確保樣本不會泄漏到書面文件上。每個塑料袋務必只放一個樣本。

儲存與運輸

1. 把樣本冷藏並在採樣的一個小時內將樣本送至化驗所。

[] 結核菌素(TB)/抗酸桿菌(afb) 檢查：收集的痰樣本數量： _____

痰的採集

1. 痰是經過深度咳嗽從肺部產生的物質。痰不是唾液。
2. 在起床時或任何時間。把痰收集到所提供的“TB”容器。

貼標籤

1. 貼在每個容器上的標籤要寫上您的名字、出生日期和採樣日期。

包裝

1. 將容器放入一個提供的袋子，並牢固地封閉袋子。
2. 將書面文件覆摺好放入樣本運輸袋的外部兜內。這就確保樣本不會泄漏到書面文件上。每個塑料袋只可以裝一個樣本。

儲存與運輸

1. 把樣本冷藏，並在採集樣本的最後一天把所有容器送至化驗所。