

دستورالعمل های مخصوص بیماران

نمونه گیری ادرار برای کلامیدیا و نایسریا گنوره (GC)

ارائه کننده مراقبت های بهداشتی و درمانی شما درخواست یک نمونه ادرار داده است. برای اینکه نتیجه آزمایش شما درست باشد، باید دستورات زیر را دقیقاً اجرا کنید.

تهیه نمونه

1. برای مدت 1 ساعت قبل از تهیه نمونه از ادرار کردن خودداری نمائید.
2. ظرفی که توسط آزمایشگاه به شما داده شده است یک علامت دارد که میزان 30 میلی لیتر را نشان می دهد. 30 میلی لیتر اول ادرار را در ظرف بریزید. بسیار مهم است که نمونه را از ابتدای جریان ادرار تهیه کنید. قسمت وسط جریان ادرار قابل قبول نیست.
3. اگر بیش از 60 میلی لیتر ادرار بدهید بر نتیجه آزمایش تأثیر خواهد گذاشت. اگر نمونه ای که تهیه کرده اید بیشتر از 60 میلی لیتر است، 1 ساعت صبر کرده و دوباره یک نمونه ادرار دیگر تهیه کنید.

برچسب زدن

1. نام، تاریخ تولد، و تاریخ تهیه نمونه را روی برچسب نوشته و روی ظرف بچسبانید.

بسته بندی

1. ظرف را در پاکت ارائه شده قرار داده و در پاکت را محکم ببندید.
2. اوراق و برگه ها را تا کرده و در جیب بیرونی پاکت ارسال نمونه بگذارید. با این کار مطمئن می شوید که نمونه بروی برگه ها و اوراق نشسته نخواهد کرد.

نگهداری و ارسال

1. ظرف را در یخچال گذاشته و در همان روز تهیه نمونه به آزمایشگاه تحویل دهید.