

<b>Consignes pour le patient :</b>
------------------------------------

<b>Urine pour <i>Chlamydia</i> et de <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (GC)</b>
--

Votre fournisseur de soins de santé a demandé un échantillon d'urine.  
Afin de produire un résultat de test de laboratoire valide, veuillez suivre ces instructions à la lettre.

**Prélèvement**

1. N'urinez pas dans l'heure précédant le prélèvement.
2. Il y a sur le contenant fourni par le laboratoire une marque de niveau indiquant 30 ml.
3. Prélevez les **30 premiers ml** d'urine que vous émettez. Il est important de recueillir le début du jet d'urine.  
L'urine du milieu du jet n'est pas acceptable.
4. Les résultats du test seront affectés si vous fournissez plus de 60 ml d'urine.
5. **Si plus de 60 ml d'urine ont été prélevés, attendez 1 heure et prélevez un autre échantillon d'urine.**

**Étiquetage**

1. Inscrivez votre nom, date de naissance et date de l'échantillon sur l'étiquette du contenant.

**Emballage**

1. Placez le contenant dans le sachet fourni et fermez-le hermétiquement.
2. Afin de garantir que l'échantillon ne fuira pas sur les papiers, pliez tout document pertinent et placez-les dans la poche extérieure du sachet de transport de l'échantillon.

**Conservation et transport**

1. Réfrigérez et apportez le contenant au laboratoire le jour même du prélèvement.