

## تعليمات للمريض

### اختبار البراز المستضد لتحديد الإصابة بالجرثومة الملوية البوابية

طلب طبيبك أن تجري اختبار البراز المستضد لتحديد الإصابة بالجرثومة الملوية البوابية. ينبغي أن تتبع التعليمات التالية من أجل الحصول على نتائج فحوصات مختبرية مجدية.

#### قبل إجراء الفحص

الرجاء أن تتأكد مع طبيبك الأدوية التي تتناولها قبل إجراء هذا الفحص.

يحتمل أن تتعارض المضادات الحيوية والأدوية المخفضة للحموضة مع هذا الفحص وينبغي عدم تناولها قبل إجراء الفحص طيلة الفترات المشار إليها بين هاتلين.

1. المضادات الحيوية مثل: أموكسيسيلين، كلاريثرومايسين، ميترونيدازول، نيتراسيكلين (4 أسابيع)
  2. مستحضرات البسموت مثل: بينو - بيسمول (أسبوعان اثنان)
  3. مثبطات البروتون مثل: نكسيوم، باربيت، بريفاسيد، لوسك، بانتولوك، بانتويرازول (تكنا®) (7 أيام)
  4. مستقيبات هيستامين H2 مثل: زنتاك، تاغامت، بيسيد (يوم واحد)
  5. مضادات الحموضة مثل: مالوكس، ديوفول، غافسكون، تامس (يوم واحد)
- إذا كنتم تتناولون أيًا من هذه الأدوية، يوصى أن تتأكدوا مع طبيبك قبل الخضوع للفحص.

#### تعليمات التجميع



ضعوا البراز في الحاوية مستخدمين المعلقة المتصلة بالغطاء. لا تملأوا الحاوية كلياً.

ضعوا البراز وصولاً إلى "خط الماء". أحكموا إغلاق الغطاء.



اضلوا بيكم بالماء والصلبون وبنوتوا الإسم وتاريخ الولادة أو رقم البطاقة الصحية، وتاريخ ووقت التجميع على كل حاوية. ضعوا الحاويات داخل أكياس بلاستيكية واقفوها.



أحضروا الحاوية إلى المختبر خلال فترة 12 ساعات من التجميع. سوف يتطلب التأخير إعادة تجميع عينة. ضعوا العينة في التلاجة لحين تحضروها إلى المختبر.



بولوا في المراض إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

4

1


5



ارفعوا مقعد المراض وضعوا صفيح من الغلاف البلاستيكي (مثلاً، غلاف ساران™) على المراض تاركين تحاراً بسيطاً في الوسط. أنزلوا مقعد المراض واقتضوا حاجتكم من البراز في الغلاف البلاستيكي.

6

2



كبيل لذلك، استخدموا وعاءاً نظيفاً أو نونية سرير معقمة. لا تدعوا الماء أو البول يلامس عينة البراز.

7

3