

Instructions pour le patient

Test d'antigènes dans les selles pour la détection d'*Helicobacter pylori*

Votre médecin vous a prescrit un test d'antigènes dans les selles pour la détection d'*H. pylori*. Afin que nous obtenions des résultats laboratoires significatifs, veuillez suivre ces instructions :

Avant le test

Veuillez discuter de votre utilisation de médicaments avec votre médecin avant le test.

Les antibiotiques et les médicaments contre l'acidité peuvent altérer les résultats du test. Ces médicaments doivent être évités selon les périodes indiquées entre parenthèses :

1. Antibiotiques, par exemple l'amoxicilline, la clarithromycine, le métronidazole, la tétracycline (4 semaines)
2. Préparations de bismuth, par exemple Pepto-Bismol (2 semaines)
3. Inhibiteurs de la pompe à protons, par exemple le Nexium, le Pariet, le Prevacid, le Losec, le Pantoloc, le Pantoprazole (Tecta®) (7 jours)
4. Antagonistes des récepteurs à l'histamine de type 2, par ex. le Zantac, le Tagamet, le Pepcid (1 jour)
5. Antiacides, par exemple le Maalox, le Diovol, le Gaviscon, les Tums (1 jour)

Si vous prenez l'un de ces médicaments, veuillez en parler à votre médecin avant que les tests ne soient effectués.

Instructions pour la cueillette d'échantillons



Urinez dans la cuvette si nécessaire.




Soulevez la lunette de la cuvette. Déposez de la pellicule de plastique (p. ex. Saran Wrap™) sur les cuvettes. Prenez soin de ne pas trop tirer la pellicule afin de laisser un creux vers le milieu de la pellicule, au niveau de la cuvette. Rabaissez la lunette de la cuvette. Faites une selle sur la pellicule de plastique.



Sinon, utilisez un bol propre ou un bassin hygiénique stérilisé. L'urine et l'eau ne doivent pas toucher à l'échantillon de selles.



À l'aide de la cuillère attachée au couvercle, déposer des selles dans le contenant. Ne remplissez pas trop le contenant.



Ajoutez des selles sur la « LIGNE DE REMPLISSAGE ». Serrez le bouchon.



Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau. Inscrivez le nom, la date de naissance, le numéro d'assurance maladie, la date et l'heure de la cueillette d'échantillon sur chacun des contenants. Déposez les contenants dans les sachets en plastique et scellez.



Rapportez le contenant au laboratoire dans les **12 heures** suivant la cueillette d'échantillon. Si vous dépassez ce délai, vous devrez recueillir de nouveaux échantillons. Réfrigérez les échantillons si vous devez attendre avant de les amener au laboratoire.