

## 환자 지침

### 헬리코박터 피로리 대변 항원 검사

귀하의 의사 헬리코박터 피로리 대변 항원 검사를 시행하도록 요청합니다. 의사는 실제 테스트 결과를 알기 위해 이러한 지침을 따릅니다.

#### 검사 전

이 검사를 받기 전에 의사와 약물 사용에 대해 상의하십시오.

항생제와 산을 낮추는 약물은 이 검사를 방해할 수 있으며 검사 전에 고티아에 표시된 기간 동안 복용하지 않습니다.

1. 항생제 *오미투시린* 클라시트로 마신 메트로니다졸 테트라 사이클린 4 주간
2. 조제된 Bismuth *펠모비스탈* 2 주간
3. 프로톤 펌프 억제제 *넥숨* 피리엔 프라베이드 로섹 판토프론 판토프로졸(Prilosec)(7 일)
4. 하소민 2 수용체 길항제 *진탁* EPR메트 펩사이드 1 일
5. 제산제 *밀록스* 디오텔 가바스콘 탐자 1 일

상기 약물 중 어느 것이라도 복용하는 경우 검사를 받기 전에 의사와 상의할 것을 권장합니다.

#### 채취 방법 설명



필요한 경우 변기에 소변을 보십시오.



**비닐 랩**

변기 시트를 올리십시오. 비닐 랩 시트(예: 사랑 랩™)를 중앙 부분이 약간 돌출 들어간 상태로 변기 위에 놓으십시오. 변기 시트를 내리십시오. 비닐 랩에 대변을 보십시오.



혹은


그 대신에 깨끗한 그릇이나 용기 변기에 변기를 사용하실 수 있습니다. 소변이나 물이 대변 검사물에 닿지 않도록하십시오.



4

뚜껑에 부착된 손가락을 사용하여 대변을 용기에 넣으십시오. 용기를 과도하게 채우지 마십시오.

5 대변을 "FILL LINE(채울 선)"까지 채우십시오. 뚜껑을 단단히 조여서 닫으십시오.



6

비누와 물로 손을 씻으십시오. 각 용기에 이름, 생년월일 또는 건강 카드 번호, 수집 날짜 및 시간을 기입하십시오. 비닐 주머니(들)에 용기(들)를 넣고 밀봉하십시오.



7

수집 후 12 시간 이내에 용기를 다시 실험실로 가져 오십시오. 지체되는 경우 검사물을 재 수집해야 합니다. 실험실에 가져갈 때까지 검사물은 냉장고에 보관하십시오.