

## ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

### ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ (Helicobacter pylori) ਸਟੂਲ (ਟੋਟੀ) ਐਂਟੀਜਨ ਜਾਂਚ

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ ਸਟੂਲ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

#### ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ


ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।


ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।


1. ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ / ਸਿਵੋਅਮੋਕਸਿਸਿਲਿਨ, ਕਲੈਰਿਥਰੋਮਾਈਸਿਨ, ਮੈਟਰੋਨਾਈਡਾਜ਼ੋਲ, ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲੀਨ (4 ਹਫ਼ਤੇ)
2. ਬਿਸਮਥ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ / ਸਿਵੋਪੈਪਟੇ-ਬਿਸਮੋਲ (2 ਹਫ਼ਤੇ)
3. ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪੰਪ ਇੰਹਿਬਿਟਰਜ਼ / ਸਿਵੋਨੈਕਸਿਅਮ, ਪੈਂਸੀਟੇਟ, ਪਰੀਟੈਸਿਡ, ਲੈਸੈਕ, ਪੈਂਟੋਲੋਕ, ਪੈਂਟੋਪ੍ਰੋਜ਼ੋਲ (ਟੈਕਟਾਓ) (7 ਦਿਨ)
4. H2 ਰਿਸੈਪਟਰ ਐਂਟਾਗੋਨਿਸਟ ਦਵਾਈਆਂ / ਸਿਵੋਜੈਂਟੈਕ, ਟੈਗਾਮੈਟ, ਪੈਪਸਿਡ (1 ਦਿਨ)
5. ਐਂਟੈਸਿਡ ਦਵਾਈਆਂ / ਸਿਵੋਮਾਲੇਕਸ, ਡਾਈਓਕੋਲ, ਗੈਵਿਸਕੋਨ, ਟਮਸ (1 ਦਿਨ)


ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।


#### ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ


- 1 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਟੌਇਲਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰੋ।
- 4 

ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚਮਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਟੂਲ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਭਰੋ। ਸਟੂਲ ਨੂੰ 'ਫਿਲ ਲਾਈਨ' ਤੱਕ ਭਰੋ। ਕੈਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਲਗਾਓ।
- 2 

**ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੈਪ**  
ਟੌਇਲਟ ਸੀਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਟੌਇਲਟ ਬਾਊਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੈਪ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਰਾਨ ਰੈਪ) ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੁੰਘ ਰੱਖੋ। ਟੌਇਲਟ ਸੀਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਲੈਟਰੀਨ ਕਰੋ।
- 5 

ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਹਰੇਕ ਕੰਟੇਨਰ ਉੱਤੇ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲਿਖੋ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ (ਬੈਗ) ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਰ (ਕੰਟੇਨਰ) ਨੂੰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰੋ।
- 3 

ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਕ ਸਾਫ਼ ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਗੀਟਰੂਮਕਤ ਕੈਂਡਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਲੈਟਰੀਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਬ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ।
- 7 

ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੋਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।