

Istruzioni per il Paziente

Istruzioni Raccolta Feci

Le sono stati forniti uno o più dei seguenti contenitori:


- Coltura Feci con Mezzo di Trasporto - Cary Blair (Liquido Rosa)
- Uova e Parassiti con Mezzo di Trasporto - SAF Fixative (Liquido Chiaro)
- Flacone Pulito (Nessun Liquido)

Riempire tutti i contenitori forniti. Non rimuovere il liquido.

Avvertenza: Il liquido è tossico. Non ingerire.



- 1** Urinare nel gabinetto se necessario.



PELLICOLA ALIMENTARE


- 2** Sollevare il sedile del gabinetto. Posizionare diversi strati di pellicola alimentare (ad es. Saran Wrap™/Cuki®) sulla tazza del gabinetto, lasciando una lieve depressione al centro. Posizionare il sedile in posizione abbassata. Depositare le feci sulla pellicola alimentare.



- 3** In alternativa, usare una ciotola pulita o una padella sanitaria da letto sterilizzata. Non consentire all'urina o all'acqua di entrare in contatto con il campione di feci.



- 4** Usando il cucchiaino fissato al coperchio, posizionare le aree sanguinose o viscido/bianche (mucose) delle feci nel contenitore/i. Non riempire troppo il contenitore/i.
Nota: Posizionare le feci nel contenitore/i di raccolta entro 30 minuti dall'escrezione.



- 5** Contenitori con liquido:
Aggiungere 2-3 cucchiaini di feci facendo innalzare il livello del liquido fino alla "LINEA DI RIEMPIMENTO" (Fill line). **Serrare bene il tappo/i e scuotere per mescolare.**
Per contenitori puliti e vuoti:
Aggiungere le feci fino alla "LINEA DI RIEMPIMENTO" (Fill line). **Serrare bene il tappo.**



- 6** Lavare le mani con acqua e sapone. Scrivere Nome, Data di Nascita o Numero di Tessera Sanitaria, Data e Ora di raccolta su ogni contenitore. Posizionare il contenitore/i nella busta/e di plastica e sigillarla.



- 7** Portare il contenitore/i al laboratorio entro 24 ore dalla raccolta. Ritardi nella consegna possono influire sui risultati degli esami. Fino al momento del trasporto dei campioni al laboratorio, refrigerare i campioni.