

## 患者指南

### 幼童尿布內的糞便採集

您的醫務人員要求您提供一個糞便樣本。

爲了獲得有意義的化驗所測試結果，請嚴格遵循下列說明。

#### 採集糞便

醫務人員會提供糞便採集容器和一個幼童的尿液採集盒。

不要直接從尿布上採集樣本，因爲洗滌劑和香氣會干擾測試結果。請在提供的所有容器內填充樣本。

1. 用塑料保鮮膜（例如Saran Wrap™）作尿布的內襯。
2. 根據與袋子一起提供的說明給幼童戴上尿液採集袋。
3. 將內襯塑料保鮮膜的尿布戴在幼童身上。
4. 在排便的30分鐘內，從塑料保鮮膜上取出糞便。
5. 使用連在蓋上的膠匙，將糞便的血污部分或白色的黏液部分（如果有的話）裝入每個提供的容器。不要把容器裝得過滿。
  - 帶液體的容器：加入二至三匙糞便直到液體達到“填充綫”，然後牢固地鎖緊蓋子。搖動容器使內容混合。
  - 不帶液體的容器：把糞便加入至“填充綫”，然後牢固地鎖緊蓋子。
6. 拆除尿液採集袋並丟棄。

#### 貼標籤

7. 貼在每個容器上的標籤要寫上幼童的名字、出生日期和採樣日期。

#### 包裝

8. 把容器放入提供的袋內，並牢固地封閉袋子。
9. 將書面文件覆摺好放入樣本運輸袋的外部兜內。這就確保樣本不會泄漏到書面文件上。

#### 儲存與運輸

10. 採樣的24小時內將容器送回至化驗所。  
延誤可能會影響測試結果。在樣本可以帶回化驗所之前，按下述方法儲存：
  - 培養(粉紅色液體) – 冷藏
  - 卵細胞和寄生蟲(透明液體) – 室溫
  - 乾淨的(無液體) – 冷藏