

## دستورالعمل های مخصوص بیماران

### نمونه گیری مدفوع برای کودکانی که از پوشک استفاده می کنند

ارائه کننده مراقبت های بهداشتی و درمانی شما درخواست یک نمونه مدفوع کرده است. برای اینکه نتیجه آزمایش شما درست باشد، باید دستورات زیر را دقیقاً اجرا کنید.

#### تهیه نمونه

به شما ظروف مخصوص نمونه گیری مدفوع و یک کیت نمونه گیری ادرار کودکان داده خواهد شد. نمونه را مستقیماً از پوشک بردارید چون ادرار، مواد تمیزکننده و عطری باعث اختلال در نتایج آزمایش خواهند شد. لطفاً تمام ظرفی که در اختیار شما قرار داده شده است را پر کنید.

1. زیر پوشک را با یک لفاف پلاستیکی (مانند Saran Wrap™) ببوشانید.
2. کیسه نمونه گیری ادرار را با رعایت دستورالعمل های ارائه شده همراه کیسه برای کودک قرار دهید.
3. پوشک دارای لفاف پلاستیکی را برای کودک ببندید.
4. ظرف مدت 30 دقیقه از کار کردن شکم، مدفوع را از لفاف پلاستیکی بردارید.
5. با استفاده از قاشق متصل به درپوش، قسمت های خون آلود یا شل/سفید (مخاط) مدفوع (در صورت وجود) در هر ظرف ارائه شده قرار دهید. ظرف ها را بیش از حد پر نکنید.
  - ظرف(های) محتوی مایع: 2 تا 3 قاشق پر مدفوع اضافه کنید تا اینکه مایع به "خط پر شدن" برسد و سپس درپوش را محکم ببندید. تکان دهید تا مخلوط شود.
  - ظرف بدون مایع: تا "خط پر شدن" مدفوع اضافه کرده و سپس درپوش را محکم ببندید.
6. کیسه نمونه گیری ادرار را برداشته و دور بیاندازید.

#### برچسب زدن

1. نام کودک، تاریخ تولد او و تاریخ تهیه نمونه را روی برچسب نوشته و روی هر ظرف بچسبانید.

#### بسته بندی

1. ظرف را در پاکت ارائه شده قرار داده و در پاکت را محکم ببندید.
2. اوراق و برگه ها را تا کرده و در جیب بیرونی پاکت ارسال نمونه بگذارید. با این کار مطمئن می شوید که نمونه بروی برگه ها و اوراق نشسته نخواهد کرد.

#### نگهداری و ارسال

1. ظرف(ها) را در مدت 24 ساعت از تهیه نمونه به آزمایشگاه برگردانید. هرگونه تأخیر می تواند بر نتایج آزمایش اثر سوء بگذارد. تا زمانی که نمونه ها را به آزمایشگاه می آورید، به ترتیب زیر نگهداری کنید:

- کشت (مایع صورتی) – در یخچال بگذارید
- تخمک و انگل (مایع شفاف) – در دمای اتاق نگهداری کنید
- تمیز (بدون مایع) – در یخچال بگذارید