

Test respiratoire pour l'Helicobacter pylori

Votre prestataire de soins de santé a demandé que vous passiez un test respiratoire à l'urée pour détecter l'Helicobacter pylori. Pour obtenir un résultat de test en laboratoire adéquat, vous devez suivre ces instructions.

Avant le test :

Remarque :

- Les patients allergiques aux agrumes ou à l'acide citrique ne peuvent pas passer ce test.
- Le test ne convient pas aux enfants de moins de trois (3) ans.
- Les données sont insuffisantes pour recommander ce test aux patientes enceintes ou qui allaitent. Veuillez discuter de ce test avec votre prestataire de soins de santé.

Veillez discuter avec votre prestataire de soins de santé des médicaments que vous prenez avant de passer ce test.

Les antiacides (p. ex., TUMS et Roloids) n'interfèrent pas avec ce test, mais les médicaments ci-dessous ne doivent pas être pris pendant la période précédant le test :

1. Antibiotiques, notamment l'amoxicilline, la clarithromycine, le métronidazole et la tétracycline (quatre semaines)
2. Préparations de bismuth, notamment du Pepto-Bismol (deux semaines)
3. Inhibiteurs de la pompe à protons, notamment du Nexium, du Pariet, du Prevacid, du Losec et du Pantoloc (deux semaines)
4. Sucralfate (deux semaines)
5. Antagonistes des récepteurs H2, notamment du Zantac, du Tagamet et du Pepcid (un jour)

Préparation au test :

Ne mangez pas, ne fumez pas, ne vapotez pas et ne buvez pas de liquides (y compris de l'eau) pendant au moins **une (1) heure** avant le test.

Lors de votre arrivée au laboratoire :

Le test dure environ 25 minutes. Vous devrez demeurer au laboratoire pour toute la durée du test.

Procédure relative à l'échantillon d'haleine :

1. Inspirez profondément et retenez votre souffle pendant dix secondes.
2. Expirez partiellement dans la pièce pour évacuer l'air de votre bouche, puis expirez complètement dans l'embout du sac de prélèvement.
3. Vissez le bouchon du sac de prélèvement pour le fermer.
4. Buvez environ 100 ml de la solution d'urée.
5. Attendez 15 minutes dans le centre de service aux patients.
IMPORTANT : Ne fumez pas, ne mangez pas et ne buvez pas pendant ce temps d'attente.
6. Fournissez un deuxième échantillon d'haleine en répétant les étapes 1 à 3 ci-dessus.