

已為您提供下面的一個或多個容器：


Cary Blair 氏糞培養運送培養基 (粉色液體)
 固定用 SAF, 糞便運送培養基 (寄生蟲及蟲卵檢測用) (透明液體)
 乾淨小瓶 (無液體)

不要棄去液體。

裝滿提供的所有容器。



1 如需要, 可先小便至馬桶內。



塑膠膜

2 抬起馬桶座圈。將塑膠膜 (例如保鮮膜™) 撲在廁缸上, 中心處留出低窪處。將馬桶座圈放下。排便至塑膠膜上。



或者

3 或者, 使用乾淨的廁缸或已滅菌的便盆。請勿讓尿液或水接觸糞便樣本。



4 使用連在蓋子上的小勺, 將糞便中的血狀或黏液/白色 (粘膜) 區域 (如果有) 置入容器中。不要填裝過滿。



5 在含液體的容器內: 加入 2-3 勺糞便直至液面升至“填滿線”。蓋緊蓋子。在空的乾淨容器 (如有提供) 內: 加入糞便至“填滿線”, 蓋緊蓋子。



6 搖動含有液體容器以混合內容物。



7 用肥皂和清水洗手。在每個容器上注明姓名、出生日期或醫保卡編號以及採集日期和時間。將容器放入塑膠袋中並密封。



8 在採集後 24 小時內將容器帶回實驗室。延遲可能會影響檢測結果。樣本在帶回實驗室之前, 按以下方法儲存:
 培養物 (粉色液體) —— 凍存
 SAF (清澈液體) —— 室溫
 乾淨小瓶 (無液體) —— 凍存